

Небезпека захворювання на лептоспіроз

Щорічно в Кіровоградській області реєструються випадки захворювань людей на лептоспіроз, в тому числі з летальним результатом. Так за 2022 рік було зареєстровано 5 випадків лептоспірозу: Кропивницький район – 2 (Соколівська ТГ, Олександрівська ТГ), Новоукраїнський район – 2 (Новоукраїнська ТГ), Олександрійський район (Онуфріївська ТГ), з них 2 випадки летальні. У 2021 році зафіксовано 7 випадків, у 2020 – 5, у 2019 – 6, у 2018 – 12, у 2017 – 11, у 2016 – 15 випадків.



Лептоспіроз – це небезпечне захворювання, спільне для тварин та людей (зооантропоноз). Інфекційна хвороба, спричинена збудником – бактерією *Leptospira*. Носіями лептоспірозу в природі найчастіше виступають інфіковані тварини (хворі та носії збудника) – переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, промислові тварини (лисиці). Від людини до людини захворювання не передається. Лептоспіри з виділеннями тварин потрапляють в довкілля – воду водоймищ (в більшості випадків непроточних), а в домашній умовах забруднюють і продукти харчування. В організм людини збудники потрапляють при вживанні таких продуктів, але частіше через мікротравми шкіри, через слизові оболонки (очі, ніс, рот) при купанні, риболовлі.

Тому часто хворіють рибалки, особи, що «печерують» раків, мисливці на водоплавну дичину (що достають підранків з боліт), працівники сільського господарства, що доглядають тварин (в тому числі хворих), працівники водно-каналізаційного господарства, жителі, що відпочивають біля водойм в природних вогнищах лептоспірозу, особи, що купаються в стоячих водоймах та мають порізи кінцівок та інших частин тіла.

Інкубаційний (прихований) період хвороби зазвичай складає 8-14 днів, але може розтягуватись до 20 днів. Захворювання починається раптово – хворі можуть навіть назвати час його початку. Симптоми варіюються від легких (головний біль, гарячка, біль у м'язах, почервоніння очей, діарея, висипання) до тяжких (ураження нирок, печінки, менінгіт і навіть летальний кінець при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою).

Лептоспіроз часто складно діагностувати, адже симптоми схожі на прояви інших захворювань, наприклад, можуть нагадувати грип, який більш характерний восени і взимку. До того ж часто захворювання може протікати без симптомів.

Раннє звертання за медичною допомогою та діагностика зазвичай забезпечують успіх лікування та видужання хворих. Пам'ятайте, що від цього залежить Ваше здоров'я.

Оскільки основними носіями лептоспірозу є мишовидні гризуни та пацюки, необхідно проводити боротьбу з ними всіма доступними методами, зокрема механічними – використання капканів та давилок та хімічними – за допомогою приманок з отрутою.

Ризики захворіти суттєво зменшуються, якщо ви уникаєте перебування у потенційно зараженій воді та ловлі риби в ній, контактів із хворими та інфікованими тваринами, проводите щеплення домашніх та сільськогосподарських тварин проти лептоспірозу, захищаєте воду для пиття та продукти харчування від доступу мишовидних гризунів, проводите заходи щодо знищення гризунів у особистих помешканнях.

Заходами боротьби з зооантропонозними інфекційними хворобами серед населення, до яких відноситься лептоспіроз, є боротьба з гризунами, тобто дератизація. Відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» дератизаційні роботи, особливо на епідемічно значимих об'єктах – це обов'язок як суб'єктів господарювання (підприємств всіх форм власності), так і органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

**Новоукраїнське районне управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Кіровоградській області**